

**ĐỀ THI HỌC KÌ II CHƯƠNG TRÌNH MỚI – ĐỀ SỐ 8****MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 6****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì II của chương trình sách giáo khoa Khoa học tự nhiên – Kết nối tri thức.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Khoa học tự nhiên
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dần trải tất cả các chương của học kì II – chương trình Khoa học tự nhiên

**Đáp án và lời giải chi tiết**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
B	A	C	C	B	B	C
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
A	B	A	D	D	C	B
<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
B	B	A	A	D	D	B
<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
D	A	A	D	D	A	C

**Phần 1. Trắc nghiệm (7 điểm)****Câu 1:** Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu?

- A. Sinh sản bằng bào tử  
B. Thân có mạch dẫn  
C. Có lá thật  
D. Chưa có rễ chính thức

**Phương pháp giải**

Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu là: thân có mạch dẫn.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 2:** Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?

A. Trắc bách diệp

B. Bèo tổ ong

C. Rêu

D. Rau bợ

**Phương pháp giải**

Cây sinh sản bằng hạt là cây trắc bách diệp.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án A

**Câu 3:** Trong các nhóm thực vật sau đây, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

A. Hạt trần

B. Dương xỉ

C. Rêu

D. Hạt kín

**Phương pháp giải**

Rêu là loài thực vật đơn giản nhất vì cơ thể chưa có mạch dẫn và chỉ có rễ giả.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án C

**Câu 4:** Đặc điểm nào sau đây không phải của ngành Giun?

A. Cơ thể dài

B. Đối xứng hai bên

C. Có lớp vỏ cứng bảo vệ

D. Phân biệt đầu thân

**Phương pháp giải**

Có lớp vỏ cứng bảo vệ cơ thể là đặc điểm của ngành Thân mềm.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án C

**Câu 5:** Động vật thuộc lớp Lưỡng cư có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Da khô, phủ vảy sừng

B. Da trần, da luôn ẩm và dễ thấm nước

C. Có vảy bao bọc khắp cơ thể

D. Cơ thể có lông mao bao phủ

**Phương pháp giải**

A là đặc điểm của lớp bò sát.

C là đặc điểm của lớp cá.

D là đặc điểm của lớp thú.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 6:** Chi trước biến đổi thành cánh da là đặc điểm của loài nào dưới đây?

A. Chim bồ câu

B. Dơi

C. Thú mỏ vịt

D. Đà điểu

**Phương pháp giải**

Chi trước biến đổi thành cánh da là đặc điểm của loài dơi, thích nghi với đời sống bay lượn.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 7:** Nấm nhầy thuộc giới:

A. Nấm

B. Động vật

C. Nguyên sinh

D. Thực vật

**Phương pháp giải**

Nấm nhầy thuộc giới nguyên sinh.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án C

**Câu 8:** Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

A. Cá heo

B. Sóc đen Côn Đảo

C. Rắn lục mũi ếch

D. Gà lôi lam đuôi trắng

**Phương pháp giải**

Cá heo không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án A

**Câu 9:** Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì:

A. cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước

B. nuôi con bằng sữa

C. bộ lông dày, giữ nhiệt

D. cơ thể có kích thước lớn

**Phương pháp giải**

Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì nuôi con bằng sữa.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 10:** Cá heo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

A. Cá

B. Thú

C. Lưỡng cư

D. Bò sát

**Phương pháp giải**

Cá heo là đại diện của nhóm Cá.

### Lời giải chi tiết

Đáp án A

**Câu 11:** Đặc điểm cơ bản nhất làm cho các loài động vật ở nước ta đa dạng và phong phú là:

- A. nước ta có địa hình phức tạp
- B. nước ta có nhiều sông hồ
- C. nước ta có diện tích rộng
- D. nước ta nằm ở vùng nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều ...

### Phương pháp giải

Đặc điểm cơ bản nhất làm cho các loài động vật ở nước ta đa dạng và phong phú là nước ta nằm ở vùng nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều ...

### Lời giải chi tiết

Đáp án D

**Câu 12:** Mục tiêu nào sau đây không phải của Công ước CBD (Convention on Biological Diversity)?

- A. Bảo toàn đa dạng sinh học.
- B. Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành.
- C. Phân phối công bằng, hợp lí lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen.
- D. Cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.

### Phương pháp giải

Mục tiêu không phải của Công ước CBD (Convention on Biological Diversity) là cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.

### Lời giải chi tiết

Đáp án D

**Câu 13:** Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá xương?

- A. Cá mập
- B. Cá đuối
- C. Cá chép
- D. Cá nhám

### Phương pháp giải

Loại cá thuộc lớp Cá xương là cá chép.

### Lời giải chi tiết

Đáp án C

**Câu 14:** Chân khớp không có đặc điểm nào dưới đây?

- A. Đa dạng về môi trường sống
- B. Số lượng loài ít
- C. Đa dạng về lối sống
- D. Đa dạng về hình thái

**Phương pháp giải**

Chân khớp không có đặc điểm: Số lượng loài ít.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 15:** Chọn câu trả lời sai ?

- A. Mọi vật đều có khối lượng.
- B. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của vật đó
- C. Trọng lượng của một vật thay đổi theo độ cao.
- D. Trọng lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật đó.

**Phương pháp giải**

Khối lượng của một vật phụ thuộc vào lực hấp dẫn của nó đối với các vật khác.

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 16:** Chọn câu sai. Quả dọi của người thợ hồ cùng lúc chịu tác dụng bởi hai lực: Trọng lực và lực kéo lên dây (lực căng dây). Hai lực này có đặc điểm:

- A. Là hai lực cân bằng
- B. Cùng chiều
- C. Có cường độ bằng nhau
- D. Cùng phương

**Phương pháp giải**

Quả dọi của người thợ hồ cùng lúc chịu tác dụng bởi hai lực: Trọng lực và lực kéo lên dây (lực căng dây). Hai lực này có đặc điểm là hai lực cân bằng, có cường độ bằng nhau, cùng phương

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 17:** Treo hai lò xo giống hệt nhau theo phương thẳng đứng gắn vật  $m_1$  và  $m_2$  ( $m_2 > m_1$ ) lần lượt vào mỗi lò xo thì

- A. Lò xo treo vật  $m_2$  dãn nhiều hơn lò xo treo vật  $m_1$ .
- B. Lò xo treo vật  $m_1$  dãn nhiều hơn lò xo treo vật  $m_2$ .
- C. Lò xo treo vật  $m_1$  dãn bằng lò xo treo vật  $m_2$ .
- D. Lò xo treo vật  $m_2$  dãn ít hơn lò xo treo vật  $m_1$ .

### Phương pháp giải

Treo hai lò xo giống hệt nhau theo phương thẳng đứng gắn vật  $m_1$  và  $m_2$  ( $m_2 > m_1$ ) lần lượt vào mỗi lò xo thì lò xo treo vật  $m_2$  dãn nhiều hơn lò xo treo vật  $m_1$ .

### Lời giải chi tiết

Đáp án A

**Câu 18:** Đơn vị trọng lượng là gì?

- A. N
- B.  $N/m^3$
- C.  $N.m^2$
- D.  $N.m$

### Phương pháp giải

Đơn vị trọng lượng là N

### Lời giải chi tiết

Đáp án A

**Câu 19:** Thả một thùng phi từ đỉnh một con dốc ta thấy thùng phi lăn được xuống chân dốc.

Chuyển động của nó là nhờ tác dụng của:

- A. Phản lực của mặt dốc tác dụng lên thùng phi
- B. Sức đẩy của gió
- C. Lực ma sát giữa thùng phi với mặt dốc
- D. Trọng lực

### Phương pháp giải

Thả một thùng phi từ đỉnh một con dốc ta thấy thùng phi lăn được xuống chân dốc. Chuyển động của nó là nhờ tác dụng của Trọng lực

### Lời giải chi tiết

Đáp án D

**Câu 20:** Trường hợp nào xuất hiện lực cản?



- A. Tàu ngầm dưới đáy biển
- B. người bơi trong nước
- C. Cá bơi trong nước
- D. Cả 3 đáp án trên

**Phương pháp giải**

Tàu ngầm dưới đáy biển, người bơi trong nước, cá bơi trong nước xuất hiện lực cản

**Lời giải chi tiết**

Đáp án D

**Câu 21:** Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi lần lượt của năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

- A. Quang năng → Động năng → Thế năng → Nhiệt năng.
- B. Quang năng → Nhiệt năng → Thế năng → Động năng.
- C. Quang năng → Thế năng → Nhiệt năng → Động năng.
- D. Nhiệt năng → Thế năng → Động năng → Quang năng.

**Phương pháp giải**

Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi lần lượt của năng lượng từ dạng nào sang dạng Quang năng → Nhiệt năng → Thế năng → Động năng

**Lời giải chi tiết**

Đáp án B

**Câu 22:** Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

- A. Năng lượng nước.
- B. Năng lượng gió.
- C. Năng lượng mặt trời.
- D. Năng lượng từ than đá.

**Phương pháp giải**

Năng lượng từ than đá không phải năng lượng tái tạo

**Lời giải chi tiết**

Đáp án D

**Câu 23:** Năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng:

- A. Nhiệt năng.
- B. Quang năng.
- C. Động năng.
- D. Điện năng.

**Phương pháp giải**

Năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng Nhiệt năng

**Lời giải chi tiết**

Đáp án A

**Câu 24:** Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

- A. Sinh khối.
- B. Khí tự nhiên.
- C. Xăng.
- D. Than đá.

**Phương pháp giải**

Năng lượng Sinh khối là năng lượng tái tạo

**Lời giải chi tiết**

Đáp án A

**Câu 25:** Biện pháp nào sau đây là không tiết kiệm năng lượng?

- A. Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt.
- B. Để điều hòa ở mức 26°C.
- C. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
- D. Sử dụng bóng đèn dây tóc chiếu sáng cho gia đình.

**Phương pháp giải**

Biện pháp sử dụng bóng đèn dây tóc chiếu sáng cho gia đình là không tiết kiệm năng lượng

**Lời giải chi tiết**

Đáp án D

**Câu 26:** Spút – nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô phóng lên vào năm nào?

- A. 1960.
- B. 1947.



C. 1950.

D. 1957.

### Phương pháp giải

Sput – nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô phóng lên vào năm 1957.

### Lời giải chi tiết

Đáp án D

**Câu 27:** Thời gian chuyển từ không Trăng đến Trăng tròn là:

A. Khoảng hai tuần

B. Khoảng ba tuần.

C. Khoảng 1 tuần.

D. Khoảng 1 tháng.

### Phương pháp giải

Thời gian chuyển từ không Trăng đến Trăng tròn là khoảng hai tuần

### Lời giải chi tiết

Đáp án A

**Câu 28:** Hành tinh nào sau đây không nằm trong hệ Mặt Trời?

A. Thiên Vương tinh.

B. Hải Vương tinh.

C. Diêm Vương tinh.

D. Thổ tinh.

### Phương pháp giải

Diêm Vương tinh không nằm trong hệ Mặt Trời

### Lời giải chi tiết

Đáp án C

## Phần 2: Tự luận (3 điểm)

### Câu 1:

a. Sao chổi là gì? Vì sao nó có cái đuôi lấp lánh rất đẹp? Sao chổi có tác hại gì không?

b. Nêu định nghĩa trục của Trái Đất và chiều quay của Trái Đất

### Phương pháp giải

Áp dụng kiến thức đã học

**Lời giải chi tiết****Đáp án**

- Sao chổi là thiên thể bị đóng băng dễ bị vỡ, gồm khối khí lẫn đá, có khối lượng mất dần sau mỗi lần xuất hiện đuôi do bị Mặt Trời làm bay hơi
- Trục của Trái Đất là đường nối từ cực Bắc đến cực Nam của nó và chiều quay của Trái Đất là từ tây sang đông.

**Câu 2:** Tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?

**Phương pháp giải**

Dựa vào kiến thức đã học về tiêu chí xác định đa dạng sinh học.

**Lời giải chi tiết**

Đa dạng sinh học ở hoang mạc thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới vì điều kiện khí hậu ở hoang mạc khắc nghiệt, chỉ có một Số ít loài sinh vật thích nghi với điều kiện sống ở đó. Rừng mưa nhiệt đới có điều kiện khí hậu phù hợp với nhiều loại sinh vật khác nhau, do đó rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao.