

**ĐỀ THI HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 4****Môn: Hóa học 12****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Hóa học 12 3 bộ sách
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Hóa 12.
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của học kì I – chương trình Hóa 12.

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

**Câu 1:** Các rạn san hô và đá vôi có thành phần chính là:

- A.  $BaCO_3$                       B.  $CaCO_3$                       C.  $MgCO_3$                       D.  $K_2CO_3$

**Câu 2:** Thực nghiệm xác định phức chất  $[Co(NH_3)_6]^{3+}$  có dạng hình học tứ diện. Mô tả nào sau đây không đúng ?

- A. điện tích của phức chất là +3.                      B. phức chất trên có 6 phối tử.  
C. nguyên tử trung tâm của phức chất là Co.                      D. điện tích của phức chất là 3+.

**Câu 3:** Trong y học, hợp chất được sử dụng để điều trị triệu chứng dư acid ở dạ dày là

- A. NaOH.                      B.  $Na_2CO_3$ .                      C.  $NaHCO_3$ .                      D.  $K_2SO_4$ .

**Câu 4.** Nguyên tố kim loại nhóm IA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

- A.  $ns^1$ .                      B.  $ns^2$ .                      C.  $ns^2np^1$ .                      D.  $1s^1$ .

**Câu 5.** Kim loại không phản ứng với nước ở điều kiện thường là

- A. K.                      B. Ba.                      C. Cu.                      D. Ca.

**Câu 6.** Một mẫu nước giếng có chứa các ion:  $Ca^{2+}$ ;  $Cl^-$ ;  $NO_3^-$ ;  $Mg^{2+}$ ;  $Na^+$ . Cho dung dịch soda vào mẫu nước giếng trên, sau phản ứng thu được số chất kết tủa là

- A. 2.                      B. 3.                      C. 1.                      D. 4.

**Câu 7.** Để nhận biết sự có mặt có ion  $Ba^{2+}$  có trong dung dịch ta dùng dung dịch

- A. HCl.                      B.  $H_2SO_4$ .                      C.  $NaNO_3$ .                      D. KCl.

**Câu 8.** Thạch cao, vôi tôi, vôi sống, đá vôi, apatite... là các nguyên liệu có thành phần chính là các hợp chất của nguyên tố

- A. Na.                      B. K.                      C. Ba.                      D. Ca.

**Câu 9.** Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

- A. Các kim loại thường có số oxi hoá là +1.  
B. Thường có khối lượng riêng lớn, cứng và khó nóng chảy.  
C. Đồng (copper) có tính dẫn điện kém hơn sắt.  
D. Các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất đều thuộc nhóm IA và IIA.

**Câu 10.** Liên kết giữa phối tử và nguyên tử trung tâm trong phức chất là loại liên kết

- A. ion.                      B. cộng hoá trị do góp chung các cặp e.  
C. cả ion và cộng hoá trị.                      D. cho - nhận.

**Câu 11.** Thí nghiệm nào sau đây kết thúc phản ứng thu được kết tủa?

- A. Cho từ từ đến dư dung dịch  $NH_3$  vào dung dịch  $CuSO_4$ , lắc đều.  
B. Sục từ từ đến dư khí  $CO_2$  vào dung dịch  $Ca(OH)_2$ .  
C. Cho từ từ đến dư dung dịch  $CaCl_2$  vào dung dịch  $NaHCO_3$ .

**D.** Cho từ từ đến dư dung dịch  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .

**Câu 12.** Phát biểu nào sau đây sai?

- A.** Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có nhiệt độ nóng chảy cao dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt, khối lượng riêng lớn và được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn
- B.** Các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất có xu hướng thể hiện nhiều trạng thái oxi hoá và tạo ra các hợp chất có màu sắc phong phú.
- C.** Cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất đều có phân lớp 4s đã bão hoà.
- D.** Phức chất  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  có nguyên tử trung tâm là  $\text{Co}^{3+}$  và phối tử là  $\text{NH}_3$ .

**Câu 13.** A, B, C là 3 muối chloride của kim loại kiềm. Để xác định A, B, C người ta tiến hành thí nghiệm như sau.

Bước 1: Nhúng dây platinum vào ống nghiệm chứa dung dịch bão hòa A.

Bước 2: Hơ nóng đầu dây trên ngọn lửa đèn khí Bunsen (khí gas).

Tiến hành thí nghiệm tương tự với dung dịch bão hòa B, C.

Màu ngọn lửa được ghi lại ở bảng sau:

Mẫu thử	A	B	C
Màu ngọn lửa	đỏ tía	tím nhạt	vàng

Cho các phát biểu sau:

- (1) Ở bước 1 phải làm sạch dây kim loại giữa những lần thí nghiệm.
- (2) Dung dịch ở bước 1 lần bất kỳ tạp chất chứa ion kim loại khác lẫn vào sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm.
- (3) Có thể phân biệt các kim loại kiềm do khi đốt hợp chất của kim loại kiềm trên ngọn lửa không màu làm ngọn lửa có màu đặc trưng.
- (4) A là KCl, B là NaCl, C là LiCl.

Số nhận định đúng là

- A.** 1.                      **B.** 2.                      **C.** 4.                      **D.** 3.

**Câu 14.** Để xác định hàm lượng  $\text{FeCO}_3$  trong quặng Siderite, người ta làm như sau: cân 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được  $\text{FeSO}_4$  trong môi trường  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn  $\text{KMnO}_4$  0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của  $\text{FeCO}_3$  là:

- A.** 12,18%                      **B.** 24,26%                      **C.** 60,9%                      **D.** 30,45%

**Câu 15.** Cho các phát biểu sau:

- (a) Nước chứa nhiều cation  $\text{Ca}^{2+}$  và  $\text{Mg}^{2+}$  là nước cứng.
- (b) Nước cứng chia làm 3 loại: nước có tính cứng tạm thời, nước có tính cứng vĩnh cửu và nước có tính cứng toàn phần.
- (c) Nước cứng gây nhiều tác hại cho sản xuất và đời sống.
- (d) Hai phương pháp làm mềm nước cứng phổ biến là phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.
- (e) Phương pháp trao đổi ion làm giảm được cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

Số phát biểu đúng là

- A.** 3.                      **B.** 2.                      **C.** 5.                      **D.** 4.

**Câu 16.** Tiến hành thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng kim loại mạnh khử ion của kim loại yếu trong dung dịch theo các bước sau đây:

**Bước 1:** Đánh sạch gỉ một chiếc đinh sắt (iron) rồi thả vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ .

**Bước 2:** Sau khoảng 10 phút, quan sát màu của chiếc đinh sắt (iron) và màu của dung dịch.

Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Đinh sắt bị phủ một lớp màu đỏ.
- B. Màu xanh của dung dịch không đổi vì đó là màu của ion sulfate
- C. Màu xanh của dung dịch bị nhạt dần vì nồng độ ion  $\text{Cu}^{2+}$  giảm dần trong quá trình phản ứng.
- D. Màu đỏ trên đinh sắt (iron) là do copper sinh ra bám vào.

**Câu 17.** Theo TCVN 5502 : 2003, các mẫu nước có tổng nồng độ  $\text{Ca}^{2+}$  và  $\text{Mg}^{2+}$  lớn hơn  $5.10^{-4}$  M là nước cứng. Cho dung dịch có nồng độ các ion như sau:  $\text{Na}^+$  (0,005 M),  $\text{Ca}^{2+}$  (0,001 M);  $\text{Mg}^{2+}$  (0,0005 M);  $\text{Cl}^-$  (0,002 M,  $\text{HCO}_3^-$  (0,0035 M);  $\text{SO}_4^{2-}$  (0,00125 M). Mẫu nước trên thuộc loại

- A. nước mềm.
- B. nước cứng tạm thời.
- C. nước cứng toàn phần.
- D. nước cứng vĩnh cửu.

**Câu 18.** Đơn chất, hợp chất kim loại nhóm IA **không** có tính chất nào sau đây:

- A. Là các kim loại mềm, nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng từ lithium đến caesium.
- B. Có tính khử mạnh, tính khử tăng từ lithium đến caesium.
- C. Được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hoả khan hoặc bình khí hiếm.
- D. Có thể phân biệt nhờ màu ngọn lửa đặc trưng khi đốt chúng trên ngọn lửa đèn khí.

## Phần II. Câu hỏi đúng, sai

**Câu 1.** Thực hiện thí nghiệm như sau:

- Cho 2 mL dung dịch  $\text{FeCl}_3$  1M vào ống nghiệm (1) và 2 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  1M vào ống nghiệm (2)
- Thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm 2 – 3 giọt dung dịch NaOH 1M, lắc nhẹ.

- a) Ống nghiệm (1) có kết tủa màu xanh lam, ống nghiệm (2) có kết tủa màu vàng. ( Sai)
- b) Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (1) có phương trình ion thu gọn là:  $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ . ( Đúng)
- c) Nếu cho NaOH dư vào cả hai ống nghiệm thì ống nghiệm (1) không thu được kết tủa, ống nghiệm (2) vẫn thu được kết tủa. (Sai)
- d) Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  thì số chất kết tủa thu được vẫn không thay đổi. (Sai)

**Câu 2.** Tiến hành thí nghiệm xác định hàm lượng iron (II) sulfate bằng phương pháp chuẩn độ thuốc tím trong môi trường sulfuric acid dư.

- Dùng pipette lấy 5,0 mL dung dịch  $\text{FeSO}_4$  cho vào bình tam giác; thêm tiếp khoảng 5 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10% (lấy bằng ống đong).
- Cho dung dịch  $\text{KMnO}_4$  vào burette, điều chỉnh thể tích dung dịch trong burette về mức 0.

- Mở khoá burette, nhỏ từng giọt dung dịch  $\text{KMnO}_4$  xuống bình tam giác, lắc đều.

a. Ban đầu dung dịch trong bình tam giác xuất hiện màu hồng rồi mất màu nhanh.

b. Cần sử dụng chất chỉ thị để nhận biết điểm kết thúc chuẩn độ.

c. Iron (II) sulfate là chất khử, thuốc tím là chất oxi hoá.

d. Chuẩn độ đến khi màu hồng tồn tại bền trong khoảng 20 giây thì dừng chuẩn độ.

**Câu 3.** Cắt mẫu sodium bằng hạt đậu xanh, làm sạch lớp dầu bằng giấy thấm dầu. Dùng kẹp gấp mẫu sodium cho vào cốc nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein.

a) Mẫu Na phản ứng chạy trên mặt nước.

b) Phản ứng giải phóng khí hydrogen.

c) Cốc nước hoá hồng.

d) Phản ứng với nước thu nhiệt.

**Câu 4.** Y là hợp chất của calcium có nhiều ở dạng đá vôi, đá hoa,...Hợp chất Z có trong thành phần của không khí và thường dùng để chữa cháy, Biết rằng, Z được sinh ra khi cho Y phản ứng với dung dịch acid mạnh.

a) Chất Y và Z lần lượt là  $\text{CaCO}_3$  và  $\text{N}_2$ .

b) Chất Y được sinh ra khi sục chất Z dư vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

c) Chất Y và Z đóng vai trò hình thành thạch nhũ trong hang động đá vôi.

d) Chất Y là nguyên liệu sản xuất  $\text{NaHCO}_3$  và  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  theo phương pháp Solvay.

### Phần III. Trả lời ngắn


**Câu 1.** Sodium carbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) là chất thường dùng để làm mềm nước cứng theo phương pháp kết tủa. Độ cứng của nước có thể tính theo số mg  $\text{CaCO}_3$  trong 1 lít nước, trong đó độ cứng không vượt quá 60mg.L-1 là nước mềm. Để xử lí một mẫu nước cứng vĩnh cửu có độ cứng a (mg  $\text{CaCO}_3$ /L) người ta cho 1 lít dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0,020M vào 19 lít mẫu nước cứng, lắc đều, thu được kết tủa  $\text{CaCO}_3$  và nước mềm Y. Nồng độ  $\text{Ca}^{2+}$  và  $\text{CO}_3^{2-}$  có trong mẫu nước mềm Y lần lượt là  $5,00.10^{-4}\text{M}$  và  $8,93.10^{-6}\text{M}$ . Giả thiết rằng, mẫu nước cứng chứa  $\text{Ca}^{2+}$  và các ion khác, các ion khác này không tham gia phản ứng, ion  $\text{CO}_3^{2-}$  và ion  $\text{Ca}^{2+}$  không bị thủy phân trong nước. Tính giá trị của a (làm tròn đến hàng đơn vị).

**Câu 2.** Calcium oxide ( $\text{CaO}$ ) còn được gọi là vôi sống, phần lớn được dùng làm vật liệu xây dựng. Ngoài ra, nó còn được dùng để làm chất hút ẩm trong công nghiệp, khử chua, tẩy uế....Có thể sản xuất vôi sống bằng cách nung đá vôi  $\text{CaCO}_3$  trong lò nung theo phương trình hoá học (1) như sau:



Phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt. Lượng nhiệt này được cung cấp từ quá trình đốt cháy hoàn toàn carbon trong lò nung theo phương trình hoá học (2):





Xét các phản ứng ở điều kiện chuẩn, hiệu suất chuyển hoá calcium carbonate thành calcium oxide là 100%. Tính khối lượng calcium oxide sản xuất được (theo tấn, làm tròn đến hàng đơn vị) trong các quá trình trên khi đốt cháy hoàn toàn 28,8 tấn carbon (graphite). Biết có 90% nhiệt lượng toả ra từ phản ứng (2) được cung cấp cho phản ứng (1) và các giá trị nhiệt tạo thành ( $\Delta_f H_{298}^0$ ) ở các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{C}(\text{graphite})$
$\Delta_f H_{298}^0$ ( $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ )	-1206,9	-393,5	-635,1	0,0

**Câu 3.** Tiến hành thí nghiệm xác định thành phần một chiếc đinh sắt (đã bị oxi hoá một phần thành gỉ sắt,  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ) theo các bước sau.

- Bước 1: Hoà tan toàn bộ đinh sắt trong dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng (dùng gấp đôi lượng phản ứng, giả thiết Fe chỉ phản ứng với acid), thu được 250 mL dung dịch X.
- Bước 2: Nhỏ dung dịch  $\text{BaCl}_2$  dư vào cốc chứa 10,0 mL dung dịch X, thu được 0,8202 gam kết tủa trắng.
- Bước 3: Tiến hành chuẩn độ 10,0 mL dung dịch X bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,02 M cần vừa đủ 12,80 mL. Khối lượng của  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ở đinh sắt ban đầu là bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

**Câu 4.** Có bao nhiêu chất bị phân huỷ bởi nhiệt độ trong dãy các chất sau:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ,  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{NaHCO}_3$ .

**Câu 5.** Khi nói về hiện tượng gỉ (rỉ) sắt khi để gang, thép để trong không khí ẩm, một học sinh đã có phát biểu sau:

- (1) Hiện tượng trên xảy ra chủ yếu do gang thép bị ăn mòn ăn mòn điện hóa.
  - (2) Khi bị ăn mòn điện hóa, nguyên tử Fe trong gang, thép đóng vai trò anode.
  - (3) Nguyên tử Fe đã bị khử thành cation  $\text{Fe}^{2+}$  theo quá trình  $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}$ .
  - (4) Nếu để gang thép trong không khí khô thì tốc độ rỉ sắt chậm hơn so với không khí ẩm
- Liệt kê các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần.

**Câu 6.** Muối Nigari ( $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ) làm đông tụ nhanh sữa đậu nành thành đậu hũ. Làm lạnh 805 gam dung dịch bão hoà  $\text{MgCl}_2$  ở  $60^\circ\text{C}$  xuống  $10^\circ\text{C}$  thì có m gam tinh thể  $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  tách ra khỏi dung dịch bão hoà. Biết độ tan của  $\text{MgCl}_2$  trong nước ở  $10^\circ\text{C}$  và  $60^\circ\text{C}$  lần lượt là 52,9 gam và 61,0 gam. Tính giá trị của m.

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiai

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiaiha

Loigiaihay.com